

CERVICAL
CANCER
FREE
FUTURE



World Health
Organization



ترجمه توسط
سامل باشی
SAALEMBASHI.IR

سرطان دهانه رحم قابل درمان است

با تشخیص زودهنگام و
درمان با کیفیت.

با این حال...

سالانه، بیش از
۳۱۱ هزار زن، از سرطان
دهانه رحم می میرند.

نابرابری



90%

از تمام مرگ و میرهای سرطان
دهانه رحم در کشورهای با درآمد
پایین و متوسط رخ می دهد

مرگ و میر



#1

اولین علت مرگ و میر
سرطان بین زنان در
کشورهای با درآمد پایین.

DIAGNOSIS



80%

از سرطان های دهانه رحم در
کشورهای با درآمد پایین در مراحل
پیشرفته تشخیص داده می شوند

در کشورهای پر درآمد

بیش از هفتاد درصد

70%

حدود 20 درصد

20~

در کشورهای کم درآمد

درصد نجات از
سرطان پس از ۵ سال

چرا این اتفاق می‌افتد؟

تشخیص دیرهنگام



عدم دسترسی
به خدمات
مورد نیاز



درمان با
کیفیت پایین
یا غیر مؤثر

در کشورهای پردرآمد

بیش از 90 درصد

90%

بیش از 90 درصد

آسیب شناسی

جراحی سرطان

در کشورهای کم درآمد

کمتر از 40 درصد

کمتر از 40 درصد

16%

پرتو درمانی

شیمی درمانی

کمتر از 30 درصد

بیش از 80 درصد

مراقبت های تسکینی

۵۵ درصد



WHO Framework
for strengthening
and scaling-up
services for the
management
of invasive
cervical cancer




ترجمه توسط
سالم باشی
SAALEMBASHI.IR

راه حل

سازمان جهانی بهداشت چارچوبی
را برای تقویت و گسترش خدمات
مدیریت سرطان دهانه رحم
تهاجمی توسعه داده است.
در ادامه با ما همراه باشید



راهنمای درمان و مراقبت سرطان دهانه رحم



access to the care pathway

موانع

یک سیستم مراقبتی، همه خدمات را به هم متصل می‌کند و به زمان در طول سفر سرطان کمک می‌کند. با این حال موانع ممکن است ایجاد شون:

- عدم آگاهی؛ ترس؛ بارداری؛ غلط؛ اینکه هنرادرای اجتماعی غرفه‌گری؛ عدم حمایت از مراقبین پایه‌نی؛ پیگیری؛ پرداخت از جیب مردم؛ عدم معرفت از مراقبین
- از سمت سیستم درمان
- عدم وجود سیستم ارجاع؛ مراقبت اولیه ضعیف؛ خدمات پردازشکاری؛ انتقال کمربود نیروی کار آموزش دیده؛ زنجیره های تامین و تدارکات غیرقابل اعتماد؛ مقررات و قوانین ضعیف؛ عدم وجود سیستم های ناوبری و ردیفی غیر منطبق

به پیش‌بینه‌ها

تقویت عناصر توانمند سیستم مراقبت بهداشتی می‌تواند موانع را برطرف کند و مراقبت با کیفیت و موثر را تضمین کند.



imperative to invest

Even with increased efforts to scale-up HPV vaccination and screening, **hundreds of thousands of women globally will still develop invasive cervical cancer every year** in the next two decades.

When women are diagnosed early enough they can almost always survive. **Cervical cancer diagnosed in its early stages has a high probability of cure.**

Treatment of **early stage** cancer is **less complex, less expensive and more effective**. Providing palliative care is our clinical and **ethical obligation** to patients and their families.

2030 TARGETS TOWARDS ELIMINATION

 **90%**
of girls fully vaccinated with the HPV vaccine by age 15

 **70%**
of women are screened with a high-performance test

 **90%**
of women identified with cervical disease receive treatment

if **MANAGEMENT OF INVASIVE CANCER** is strengthened,
along with prevention and early detection:

by 2030 we can reduce cervical cancer deaths by more than 30% & every woman who needs it will be able to access palliative care.

For more information: <https://www.who.int/>